

Programa Vacunación Adultos / HERPES ZOSTER (Culebrilla)

¿QUÉ ES EL HERPES ZÓSTER?

El herpes zóster es una infección viral, que produce erupción cutánea dolorosa que viene acompañada, a menudo, de ampollas.

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS Y CONSECUENCIAS?

Por lo general, la erupción de la culebrilla aparece en un lado de la cara o del cuerpo y dura de 2 a 4 semanas. Su síntoma principal es dolor, que puede ser bastante intenso. Otros síntomas de la culebrilla pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y malestar estomacal.

Con muy poca frecuencia, una infección por culebrilla puede producir neumonía, problemas de audición, ceguera, inflamación cerebral (encefalitis) o la muerte.

¿EN QUÉ CASOS NO ESTÁ INDICADA LA VACUNA CONTRA LA CULEBRILLA?

- Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica severa.
- Si es un paciente con alteración del sistema inmunitario, como HIV/SIDA, enfermedad oncológica, uso de corticoides, etc.
- Si está embarazada o podría estar embarazada.
- Si tiene una enfermedad aguda moderada o severa, esto incluye a cualquier persona con una temperatura de 38.5 °C o superior.

¿QUÉ ADULTOS DEBEN APLICARSE LA VACUNA?

Se recomienda una dosis única de la vacuna contra la culebrilla para los adultos a partir de los 50 años o mayores.

¿CADA CUANTO SE APLICA LA VACUNA?

Dosis única.